Sur les Collections botaniques faites par M. Alluaud dans l'Afrique Orientale, spécialement sur les monts Kilima-Ndjaro, Kénya et Rouwenzori, 1908-1909,

PAR LE R. P. SACLEUX, CORRESPONDANT DU MUSEUM.

Apétales.

- 398. Amaranthus caudatus L. Ouganda, près de Kampala, 1, 200 mètres, février 1909.
 - 402. Amarantuus Blitum. L. Ouganda, février 1909.
- 193. Achyranthes aspera L. Kénya N., à Ndaïka, 1,200 mètres, février 1909.
- 166. Oxygonum atriplicifolium Mart., var. sinuatum Baker. Kénya N. O., prairies de Ngaré-nyouki, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur blanche.
- 20. Protea kilimandscharica Engler. Kilima-Ndjaro S. E., zone des prairies, 2,850 mètres, octobre 1908. Arbuste; fleur blanche.
- 11. Protea abyssinica Willd. Kilima-Ndjaro, à Kiléma, dans les parties incultes de la région des cultures, 1,400 mètres, octobre 1908. Arbuste; fleur blanche.
- 352. Piper capense L. Rouwenzori E., vallée du Moboukou, dans la forêt obscure du Mahoma, 2,000 mètres, janvier 1909. Chaton blanc.
- 289. Parietaria debilis Forsk. Rouwenzori E., val de Bouamba, dans la haute vallée du Moboukou, 3,500 mètres, janvier 1909. Fleur blanchâtre; la plante tapisse les abris sous roche.
- 349. FAUREA SALIGNA Harv. Rouwenzori E., vallée du Moboukou, 2,300 mètres, janvier 1909. Très grand arbre, le colosse de la forêt moyenne et supérieure du Mahoma (2,200-2,400 mètres); fleur blanche.
- *386. Phyllantius (Menardia) Sthulmannii Pax (?). Ounyoro méridional, à Kagadi, 1,300 mètres, février 1909. Arbuste à fleur blanche; plante of.
- 119. CLUYTIA ABYSSINICA Taub. et Spach (?).— Kilima-Ndjaro S. E., zone des cultures à Kiléma, 1,500 mètres, octobre 1908. Fleur blanche.
- 224. Croton маскозтасниць Hochst. Kénya S. O., zone inférieure à Wambogo, novembre 1908. Arbuste.

Gymnospermes.

160. Juniperus procera Hochst. — Kénya N. O., prairies de Ngarényouki, 2,000 mètres, novembre 1908. Grand arbre.

Monocotylédones.

- *334. Satyrium coriophoroides A. Rich. Rouwenzori E., marécages de la haute vallée du Mohoukou, 2,850 mètres, janvier 1909. Fleur rouge sombre.
- *304. Disa Stairsii Kränzlin (?) D. Wissmannii Kranzl. Rouwenzori E., sur les bords du Moboukou, 2,850 mètres, janvier 1909. Fleur rouge.
- 93. Aristea alata Baker. Kilima-Ndjaro S. E., 2,100-2,300 mètres, octobre 1908. Fleur violette.
- 19. Dierama pendula Baker. Kilima-Ndjaro S. E., 2,800-3,000 mètres, octobre 1908. Fleur bleu violacé.
- *54. Gladiolus (Eugladiolus) splendidus Rendle.— Kilima-Ndjaro S. E., zone moyenne des prairies, 2,800 mètres, octobre 1908. Fleur rouge.
- 216. Hypoxis villosa L. Kénya N. O., prairies de la zone inférieure, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur jaune.
- 397. Hæmanthus multiflorus Martyn. Ouganda central, 1,200 mètres, février 1909. Fleur rouge.
- *342. Сиоамантии Wollastonii A. R. Rendle.— Rouwenzori E., forêt de Nokitawa, 2,650 mètres, janvier 1909. Fleur rouge vif.
- 135. Crinum Schimperi Vatke (?). Kénya N. O., prairies de la zone inférieure sur le bord de la rivière Amboni, 1,900 mètres, novembre 1908. Fleur blanche avec stries lilas.
- 134. Asparagus asiaticus L. Kénya N. O., zone inférieure, 1,900 mètres, novembre 1908. Fleur blanche.
- 382. Dracoena fragrans Gawl. Toro boréal, Nyakitojo, 1,470 mètres, février 1909. Tige de 4 à 5 mètres; fleur blanche.
- 217. Bulbine asphodeloides Schultz. Kénya N. O., prairies de la zone inférieure, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur jaune.
- *136. Anthericum corymbosum Baker (?). Kénya N. O., prairies de la zone inférieure, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur blanche à stries violettes.

- 215. Androcymbium melantholdes Willd., var. striatum Baker. Kénya N.O., prairies de la zone inférieure, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur blanc jaunâtre.
- 172. Commelina Benghalensis L. (?). Kénya N. O., prairies de Ngarényouki, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur bleue.
- 170. Commelina purpubea C. B. Clarke. Kénya N.O., prairies de Ngaré-nyouki, 2,000 mètres, novembre 1908. Fleur jaune rosé.
- 233. Aneilema sinicum Lindley. Kikouyou, 1,250 mètres, novembre 1908. Fleur lilas clair.
- 248. Aneilema æquinoctiale Kunth. Kikouyou, 1,450 mètres, novembre 1908. Fleur jaune.
- 228. Mariscus Hemisphæricus C. B. Clarke (?). Kikoiyou, prairies, 1,450-1,600 mètres, novembre 1908. Ombelle blanche.
- 400. Pennisetum Benthamii Steid. Ouganda, janvier 1909. «Herbe à éléphants.»

Cryptogames.

- 87. Selaginella Kraussiana Alph. Brongn. (?). Kilima-Ndjaro S. E., zone moyenne des forêts, 2,100-2,300 mètres, octobre 1908.
- 1. Selaginella abyssinica Spring (?). Kilima-Ndjaro, zone des cultures, 1,450 mètres, septembre 1908. 128. Kikouyou, sur le bord de la rivière Thika, 1,350 mètres, octobre 1908.

Fougères récoltées par M. Alluaud dans l'Afrique orientale en 1908-1909,

PAR S. A. LE PRINCE ROLAND BONAPARTE.

- 266. Hymenophyllum capillare Desvaux, var. *majus* Rosen. Rouwenzori E., vallée du Moboukou, 2,650 mètres : suspendu aux rochers ou aux troncs, janvier 1909.
- 82. Hymenophyllum Kuhnii C. Christ. = H. Meyeri Kuhn. Kilima-Ndjaro S. E., zone moyenne des forêts, 2,100-2,300 mètres, octobre 1908.
- 254. Dryopteris thelypteris A. Gray, var. squamigera Schlecht. Toro central, sur les bords marécageux des lacs Vijongo, 1,500 mètres, janvier 1909.